

## BELLARDIA TRIXAGO (L.) ÎN FLORA ROMÂNIEI

V. CIOCÂRLAN\*, M. COSTEA\*

**Résumé:** Les auteurs publient l'espèce *Bellardia trixago* (L.) All., découverte sur le territoire du port Constanța, comme une nouveauté pour la flore de Roumanie.

**Mots clé:** *Bellardia trixago* (L.) All., Roumanie.

Genul *Bellardia* All. cuprinde o singură specie *B. trixago* (L.) All., specie anuală, semiparazită, noutate în flora României. Este asemănătoare cu *Bartsia* L. și unii autori o păstrează încă în genul *Bartsia* (2). Cele două genuri, *Bellardia* și *Bartsia* se deosebesc astfel:

### ***Bartsia* L.**

Cuprinde specii perene cu rizom. Frunze opuse, sesile. Flori grupate în raceme spiciforme, terminale. Caliciul este tubulos, terminat cu 4 dinți. Corola bilabiata, purpuriu-închis. Androceu didinam. Capsula loculicidă, cu puține semințe, de circa 2 mm. Tegumentul seminal prezintă 2-3 aripi membranoase, longitudinale.

### ***Bellardia* All.**

Asemănător cu *Bartsia*, dar anual. Caliciul este campanulat, terminat cu 2 dinți scurți. Capsula are numeroase semințe mici de circa 0,7 mm. Tegumentul seminal nu este aripat, ci prezintă numeroase striuri longitudinale și striuri transversale.

### ***B. trixago* (L.) All. (Fig. 1).**

Specie anuală, glandulos-păroasă, cu tulpina simplă sau ramificată, de 20-60 cm înălțime. Frunzele sunt liniar-lanceolate, serate, de 2-8 cm lungime și 2-12 mm lățime. Inflorescența este terminală, spiciformă. Florile prezintă bractee mai mult sau mai puțin ovate, întregi. Caliciul este campanulat, de 8-10 mm lungime, terminat cu 2 lobi (dinți) scurți. Corola este purpurie de 20-25 mm lungime. Capsula subglobuloasă, cu numeroase semințe mai mult sau mai puțin oblongi, mici, de circa 0,7 mm lungime. Tegumentul seminal prezintă striuri fine longitudinale și transversale.  $2n = 24$  (3).

*Răspândirea în România:* în portul Constanța, pe nisipuri și pietrișuri înierbate.

*Răspândirea generală:* Europa de sud, în țările și insulele mediteraneene, din Portugalia, Spania, Italia, Albania, Grecia, Turcia, până în sud-estul Bulgariei. De menționat că în Bulgaria s-a întâlnit și în culturi de grâu (1).

Material de herbar: BUAG nr. 23781.

### **Bibliografie**

1. ANDREEV N., 1995 – *Bellardia* în Flora Reipublicae Bulgaricae, X, Serdicae.
2. KERGUÉLEN M., 1993 – Index synonymique de la Flore de France, Paris.
3. TUTIN T., 1972 – *Bellardia* în Flora Europaea, 3, Cambridge.

---

\* Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București




Fig. 1 – *Bellardia trixago* (L.) All.  
1 - habitus, 1a - frunză, 1b - floare, 1c - gineceu, 1d - fruct (după Andreev)